


**АО “Олайнфарм”, Латвия**

**ИНСТРУКЦИЯ  
(ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)  
по медицинскому применению лекарственного средства**

**ФЕНКАРОЛ® 50 мг таблетки**

**Торговое наименование лекарственного средства  
ФЕНКАРОЛ® 50 мг таблетки**



*Международное непатентованное название: quifenadinum (хиленадин).*

**Состав лекарственного средства**

Одна таблетка содержит:

*действующее вещество – хиленадина гидрохлорид 50 мг;*

*вспомогательные вещества – сахар, крахмал картофельный (E1401), крахмал кукурузный модифицированный (E1422), кальция стеарат (E572).*

**Форма выпуска**

Таблетки.

**Общая характеристика**

Плоскоцилиндрические с фаской таблетки белого или почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа и код ATX**

Прочие антигистаминные средства для системного применения. Код ATX: R06AX31

**Фармакологические свойства**

Фенкарол® – антигистаминное средство, уменьшает воздействие гистамина на органы и их системы. В отличие от других классических лекарственных средств этой группы, Фенкарол® обладает особым механизмом действия: лекарственное средство блокирует гистаминовые H<sub>1</sub>-рецепторы в периферических тканях, а также активирует энзим диаминоксидазу (гистаминазу), таким образом снижая содержание гистамина в тканях. Этим объясняется эффективность Фенкарола® для больных, лечение которых другими противогистаминными средствами неэффективно.

Фенкарол® быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и уже через 30 минут обнаруживается в тканях организма. Максимальная концентрация активного вещества в плазме крови достигается через час. Фенкарол® метаболизируется в печени. Метаболиты Фенкарола® и неизмененная доля лекарственного средства выводятся в основном с мочой и желчью в течение 48 часов.

**Показания к применению**

*Взрослым*

Поллиоз, острая и хроническая крапивница, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, ангионевротический отек, аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, экзема), кожный зуд (на фоне гиперпаратиреоза, в активной фазе гепатита), аллергические реакции, связанные с приемом лекарственных средств или пищевых продуктов.

## **Способ применения и дозы**


Фенкарол® принимают внутрь сразу после еды.

Взрослым назначают по 25-50 мг 2-4 раза в день. Максимальная суточная доза – 200 мг.

Фенкарол® 50 мг таблетки невозможно разделить на две равные дозы, поэтому в случае дозирования лекарственного средства для взрослых пациентов по 25 мг следует применять Фенкарол 25 мг таблетки.

Длительность курса лечения составляет 10-20 дней. При необходимости курс повторяют.

Если пропустили прием, примите лекарственное средство, как только вспомните об этом, но пропустите, если уже наступило время следующего приема. Никогда не принимайте двойные дозы.



## **Побочные действия**

Классификация нежелательных побочных реакций по частоте развития: очень часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ); редко ( $\geq 1/10\ 000$  до  $< 1/1000$ ); очень редко ( $< 1/10\ 000$ ).

*Нарушения со стороны нервной системы:* нечасто – головная боль, сонливость.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* часто – сухость во рту; нечасто – диспепсические расстройства (тошнота, рвота), которые обычно исчезают при снижении дозы или отмене лекарственного средства.

При появлении побочных действий, особенно таких, которые не указаны в листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к действующему веществу и/или любому из вспомогательных компонентов лекарственного средства.
- Первые три месяца беременности.  
Во втором и третьем триместрах беременности – не рекомендуется.
- Грудное вскармливание.

## **Передозировка**

При подозрении на передозировку немедленно вызвать врача.

*Симптомы:* прием высоких доз лекарственного средства может вызвать сухость слизистых оболочек, головную боль, рвоту, боль в эпигастрии и диспепсические явления.

*Лечение:* необходимо обеспечить симптоматическую и поддерживающую терапию жизненно важных функций организма. Специфического антидота нет.

## **Меры предосторожности**

С осторожностью применять при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и/или почек.

Фенкарол® не оказывает угнетающего действия на центральную нервную систему, но в отдельных случаях наблюдается слабый седативный эффект.

В состав лекарственного средства входит сахар, поэтому при непереносимости каких-либо сахаров, перед применением данного лекарственного средства, проконсультируйтесь с врачом.

## **Применение во время беременности и в период кормления грудью**

В первые три месяца беременности применение лекарственного средства противопоказано. Во втором и третьем триместре – не рекомендуется.

Неизвестно, выделяется ли лекарственное средство в грудное молоко, поэтому кормление грудью во время применения лекарственного средства противопоказано.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами**

Лицам, работа которых требует быстрой физической или психической реакции (водители транспорта и др.), следует предварительно установить (путем краткосрочного назначения), не оказывает ли лекарственное средство седативного действия. Лицам, у которых проявляется седативное действие, не рекомендуется управлять транспортным средством или опасными механизмами.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Фенкарол<sup>®</sup> не усиливает угнетающее действие алкоголя и снотворных средств на центральную нервную систему (ЦНС). Фенкарол<sup>®</sup> обладает слабыми М-холино-блокирующими свойствами, но при снижении моторики желудочно-кишечного тракта всасывание медленно абсорбирующихся медикаментов может усиливаться (напр., антикоагулянты непрямого действия – кумарины).

## **Срок годности**

4 года. Не применять лекарственное средство после истечения срока годности.

## **Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

Таблетки по 15 штук упаковывают в блистеры из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой лакированной. 2 блистера (30 таблеток) вместе с инструкцией (листок-вкладыш) по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

## **Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта врача.

## **Информация о производителе (заявителе)**

АО «Олайнфарм».

Адрес: ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия.

## **Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей по качеству продукции (товара):**

Представительство АО «Олайнфарм», г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18 «Б», к. 501, Республика Беларусь.

**Дата последнего обновления листка-вкладыша лекарственного средства: январь 2016 г.**

